ข้อสอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน)

10/10

แบบทดสอบก่อน-หลัง การรับฟังการบรรยาย

จงเขียนเครื่องหมาย ถูก √ หน้าข้อที่ถูกต้อง และ เครื่องหมาย ผิด X หน้าที่ข้อที่ผิด

..... 1.โรค Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเจริญเติบโตตามอวัยวะที่มีเซลล์ epithelium cells

..... 2.เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา มีระยะฟักตัวประมาณ 28 วัน และก่อโรคในโค กระบือ

..... 3.โรคนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในสัตว์ มีอัตราการป่วย 5-45% และอัตราการตายน้อยกว่า 10%

..... 4.สัตว์อาจจะมีไข้อุณหภูมิสูงได้ถึง 41 องศาเซลเซียส ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม.บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ

..... 5.ผ่าซากพบตุ่มนูนและแผลหลุมกระจายทั่วไปตามผิวหนัง อาจลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ และพบแผลหลุมตามเยื่อเมือกบริเวณทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ

..... 6.ช่องทางหลักของการติดเชื้อ คือแมลงดูดเลือด ได้แก่ เห็บ แมลงวันดูดเลือด ยุง เป็นต้น

..... 7.สามารถพบเชื้อไวรัสได้ในเลือด น้ำลาย สิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูก และน้ำเชื้อ

..... 8.การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย

..... 9.การควบคุมโรคจะดำเนินงานควบคู่กันระหว่างการควบคุมแมลงพาหะ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การคัดทิ้ง และการฉีดวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค

..... 10.การเก็บตัวอย่าง ได้แก่ รอยโรคที่ผิวหนัง แช่ Glycerin buffer, เลือด Whole blood ใส่หลอด EDTA เพื่อตรวจสารพันธุกรรม, ซีรั่ม เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

10/16

ข้อสอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน)

แบบทดสอบก่อน/หลัง การรับฟังการบรรยาย

จงเขียนเครื่องหมาย ถูก √ หน้าข้อที่ถูกต้อง และ เครื่องหมาย ผิด X หน้าที่ข้อที่ผิด

..../..... 1.โรค Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเจริญเติบโตตามอวัยวะที่มีเซลล์ epithelium cells

..../..... 2.เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา มีระยะฟักตัวประมาณ 28 วัน และก่อโรคในโค กระบือ

..../..... 3.โรคนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในสัตว์ มีอัตราการป่วย 5-45% และอัตราการตายน้อยกว่า 10%

..../..... 4.สัตว์อาจจะมีไข้อุณหภูมิสูงได้ถึง 41 องศาเซลเซียส ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม.บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ

..../..... 5.ผ่าซากพบตุ่มนูนและแผลหลุมกระจายทั่วไปตามผิวหนัง อาจลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ และพบแผลหลุมตามเยื่อเมือกบริเวณทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ

..../..... 6.ช่องทางหลักของการติดเชื้อ คือแมลงดูดเลือด ได้แก่ เห็บ แมลงวันดูดเลือด ยุง เป็นต้น

..../..... 7.สามารถพบเชื้อไวรัสได้ในเลือด น้ำลาย สิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูก และน้ำเชื้อ

..../..... 8.การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย

..../..... 9.การควบคุมโรคจะดำเนินงานควบคู่กันระหว่างการควบคุมแมลงพาหะ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การคัดทิ้ง และการฉีดวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค

..../..... 10.การเก็บตัวอย่าง ได้แก่ รอยโรคที่ผิวหนัง แช่ Glycerin buffer, เลือด Whole blood ใส่หลอด EDTA เพื่อตรวจสารพันธุกรรม, ซีรั่ม เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

ข้อสอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน)

แบบทดสอบก่อน-หลัง การรับฟังการบรรยาย

จงเขียนเครื่องหมาย ถูก √ หน้าข้อที่ถูกต้อง และ เครื่องหมาย ผิด X หน้าที่ข้อที่ผิด

..... 1.โรค Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเจริญเติบโตตามอวัยวะที่มีเซลล์ epithelium cells

..... 2.เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา มีระยะฟักตัวประมาณ 28 วัน และก่อโรคในโค กระบือ

..... 3.โรคนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในสัตว์ มีอัตราการป่วย 5-45% และอัตราการตายน้อยกว่า 10%

..... 4.สัตว์อาจจะมีไข้อุณหภูมิสูงได้ถึง 41 องศาเซลเซียส ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม.บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ

..... 5.ผ่าซากพบตุ่มนูนและแผลหลุมกระจายทั่วไปตามผิวหนัง อาจลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ และพบแผลหลุมตามเยื่อเมือกบริเวณทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ

..... 6.ช่องทางหลักของการติดเชื้อ คือแมลงดูดเลือด ได้แก่ เห็บ แมลงวันดูดเลือด ยุง เป็นต้น

..... 7.สามารถพบเชื้อไวรัสได้ในเลือด น้ำลาย สิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูก และน้ำเชื้อ

..... 8.การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย

..... 9.การควบคุมโรคจะดำเนินงานควบคู่กันระหว่างการควบคุมแมลงพาหะ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การคัดทิ้ง และการฉีดวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค

..... 10.การเก็บตัวอย่าง ได้แก่ รอยโรคที่ผิวหนัง แช่ Glycerin buffer, เลือด Whole blood ใส่หลอด EDTA เพื่อตรวจสารพันธุกรรม, ซีรั่ม เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

10/10

ข้อสอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน)

แบบทดสอบก่อน-หลัง การรับฟังการบรรยาย

จงเขียนเครื่องหมาย ถูก √ หน้าข้อที่ถูกต้อง และ เครื่องหมาย ผิด X หน้าที่ข้อที่ผิด

✓ 1.โรค Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเจริญเติบโตตามอวัยวะที่มีเซลล์ epithelium cells

✓ 2.เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา มีระยะฟักตัวประมาณ 28 วัน และก่อโรคในโค กระบือ

✓ 3.โรคนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในสัตว์ มีอัตราการป่วย 5-45% และอัตราการตายน้อยกว่า 10%

✓ 4.สัตว์อาจจะมีไข้อุณหภูมิสูงได้ถึง 41 องศาเซลเซียส ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม.บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ

✓ 5.ผ่าซากพบตุ่มนูนและแผลหลุมกระจายทั่วไปตามผิวหนัง อาจลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ และพบแผลหลุมตามเยื่อเมือกบริเวณทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ

✓ 6.ช่องทางหลักของการติดเชื้อ คือแมลงดูดเลือด ได้แก่ เห็บ แมลงวันดูดเลือด ยุง เป็นต้น

✓ 7.สามารถพบเชื้อไวรัสได้ในเลือด น้ำลาย สิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูก และน้ำเชื้อ

✓ 8.การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย

✓ 9.การควบคุมโรคจะดำเนินงานควบคู่กันระหว่างการควบคุมแมลงพาหะ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การคัดทิ้ง และการฉีดวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค

✓ 10.การเก็บตัวอย่าง ได้แก่ รอยโรคที่ผิวหนัง แช่ Glycerin buffer, เลือด Whole blood ใส่หลอด EDTA เพื่อตรวจสารพันธุกรรม, ซีรั่ม เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

10
10

ข้อสอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน)

แบบทดสอบก่อน-หลัง การรับฟังการบรรยาย

จงเขียนเครื่องหมาย ถูก √ หน้าข้อที่ถูกต้อง และ เครื่องหมาย ผิด X หน้าที่ข้อที่ผิด

.....✓..... 1.โรค Lumpy skin disease หรือ โรคลัมปี สกิน เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถเจริญเติบโตตามอวัยวะที่มีเซลล์ epithelium cells

.....✓..... 2.เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา มีระยะฟักตัวประมาณ 28 วัน และก่อโรคในโค กระบือ

.....✓..... 3.โรคนี้ไม่ได้จัดว่าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ในสัตว์ มีอัตราการป่วย 5-45% และอัตราการตายน้อยกว่า 10%

.....✓..... 4.สัตว์อาจจะมีไข้อุณหภูมิสูงได้ถึง 41 องศาเซลเซียส ซึม เบื่ออาหาร ซูบผอม ต่อมน้ำเหลืองบวมโต เกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-5 ซม.บริเวณหัว คอ ขา เต้านม อวัยวะเพศ

.....✓..... 5.ผ่าซากพบตุ่มนูนและแผลหลุมกระจายทั่วไปตามผิวหนัง อาจลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ และพบแผลหลุมตามเยื่อเมือกบริเวณทางเดินอาหาร และทางเดินหายใจ

.....✓..... 6.ช่องทางหลักของการติดเชื้อ คือแมลงดูดเลือด ได้แก่ เห็บ แมลงวันดูดเลือด ยุง เป็นต้น

.....✓..... 7.สามารถพบเชื้อไวรัสได้ในเลือด น้ำลาย สิ่งคัดหลั่งจากตาและจมูก และน้ำเชื้อ

.....✓..... 8.การใช้วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย

.....✓..... 9.การควบคุมโรคจะดำเนินงานควบคู่กันระหว่างการควบคุมแมลงพาหะ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การคัดทิ้ง และการฉีดวัคซีนเพื่อการควบคุมโรค

.....✓..... 10.การเก็บตัวอย่าง ได้แก่ รอยโรคที่ผิวหนัง แช่ Glycerin buffer, เลือด Whole blood ใส่หลอด EDTA เพื่อตรวจสารพันธุกรรม, ซีรั่ม เพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกัน เป็นต้น